



Paziente Cognome Nome

Magenta, Data corrente

INDICAZIONI POST-CHIRURGICHE AL PAZIENTE

Direttore Sanitario: Dr. Demetrio Lambloum

Gentile Paziente, con questo documento, si riassumono le raccomandazioni generali successive al suo trattamento - già oralmente espresse dal Medico - che dovrà seguire:

GIORNO INTERVENTO

- Mantenere la garza per un'ora dopo l'intervento;
- Seguire una dieta a base di alimenti morbidi e freddi;
- Onde evitare l'insorgere di emorragie secondarie, si sconsiglia la pratica sportiva;
- Applicare ghiaccio sulla parte esterna della guancia interessata;
- Limitare l'alimentazione a cibi liquidi e freddi (es. succhi frutta, yogurt, etc.)
- Non risciacquare o "sputare saliva" per tutto l'arco della giornata;
- Non fumare;
- Evitare grandi sforzi.

GIORNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO

- Usare in modo delicato un collutorio a base di Triclosan o Clorexidina (Corsodyl, Dentosan, Plak-Out) almeno 2/3 volte al giorno dopo i pasti ed effettuare accurata igiene orale per almeno una settimana;
- Utilizzare Alovex gel sulla ferita 2/ 3 volte al giorno per i successivi 7gg
- Utilizzare uno spazzolino chirurgico e non elettrico o a idrogetto
- Evitare di masticare direttamente sulla zona dell'impianto nelle 2/3 settimane successive all'intervento;
- Se l'impianto si rende visibile, non toccarlo con le dita e non "giocare" con la lingua sullo stesso.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

- Amoxicillina + Acido Clavulanico 875/125: 1 compressa o bustina ogni 12 ore per 6 giorni;
- In caso di allergia alla Penicillina (Amoxicillina), assumere Clindamicina 150mg : 1 compressa ogni 8 ore per 6 giorni.


Ragione Sociale:

ALS – Assistenza Lavoro Salute S.r.l.

Via Brenno Cavallari, 21 – 20013 Magenta (MI)

C.F. / P.Iva 11447960961

Scala del dolore



- In caso di dolore sopra la soglia tollerabile – ovvero compresa tra i valori 0 e 2 - assumere Brufen 600 mg: 1 compressa appena si toglie la garza con mezzo bicchiere di acqua e, all’occorrenza, fino ad un massimo di 3 compresse al giorno;
- In caso di dolore eccessivo - ovvero compreso tra i valori 6 e 10 – rivolgersi all’odontoiatra oppure alla clinica di riferimento.

EVENTUALI MODIFICHE AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO O ULTERIORI INDICAZIONI:

A tutela della sua salute, la invitiamo a seguire le presenti istruzioni in aggiunta a quelle già ricevute oralmente dal Medico. Per qualsiasi dubbio o chiarimento contatti il nostro Centro. Grazie per la collaborazione.

Firma paziente Cognome Nome

Firma Odontoiatra:

Dr. Cognome

Ragione Sociale:
ALS – Assistenza Lavoro Salute S.r.l.
 Via Brenno Cavallari, 21 – 20013 Magenta (MI)
 C.F. / P.Iva 11447960961